

Primestar[®]

Agrivalle[®]

FICHA TÉCNICA

Mistura equilibrada para a fase inicial das culturas.

Primestar é uma mistura equilibrada de nutrientes solúveis em água para aplicações foliares. Além de Nitrogênio nítrico e amoniacal, contém em sua formulação quantidades ideais de Fósforo e Potássio balanceadas para a fase inicial das plantas.

Garantias e especificações:

Total de nutrientes solúveis em água:

N - **13,00%**

P2O5 - **13,00%**

K2O - **21,00%**

Mg - **1,00%**

S - **1,00%**

B - **1,80%**

Mo - **0,18%**

Natureza física - **Sólido** | Solubilidade em água - **250 g/L** | Maior relação soluto/solvente - **60 g/L** |

Índice Salino - **84%** | CE - **370 mS/cm** | Aplicação - **Foliar e Fertirrigação** | **Fertilizante Mineral Misto**

Embalagens:



Recomendação de Uso:

CULTURAS	DOSE (Kg/ha) FOLIAR	DOSE (Kg/ha) FERTIRRIGAÇÃO	RECOMENDAÇÕES
Alho	2,0 a 3,0	6,0	Aplicar após transplântio e repetir após 7/10 dias.
Batata	2,0 a 4,0	6,0	Iniciar na emissão dos estolões e realizar 2 a 3 aplicações a cada 10 dias.
Beterraba e Cenoura	2,0 a 3,0	6,0	2 aplicações, iniciando 7 a 10 dias após o plantio/transplântio.
Abobrinha, Abóbora	2,0	4,0	Aplicar 7 dias após transplântio e repetir após 5 dias.
Tetsukabuto, Pepino	2,0	4,0	Aplicar 7 dias após transplântio e repetir após 5 dias.
Brássicas	2,0 a 3,0	6,0	Aplicar 7 dias após transplântio e repetir após 7 dias.
Tomate, Pimentão	2,0 a 3,0	4,0	Aplicar 7 dias após transplântio e repetir após 7 dias.
Café	2,0 a 4,0	6,0	1 a 2 aplicações, de julho a agosto.
Cebola	2,0 a 3,0	6,0	Aplicar 7 dias após plantio/transplântio e repetir após 7 dias.
Folhosas	2,0 a 3,0	6,0	Aplicar 7 dias após transplântio e repetir após 7 dias.
Frutíferas	2,0 a 3,0	6,0	2 a 3 aplicações no período vegetativo.

Consulte sempre a orientação de um(a) Técnico(a) Agrícola ou Engenheiro(a) Agrônomo(a)

