

UpBlue®

Fertilizante Mineral Misto Fertilizante Foliar

UpBlue® é um Fertilizante Mineral Misto em solução para aplicação foliar, contendo os nutrientes cobre, enxofre e magnésio prontamente disponíveis para as plantas, em uma formulação segura e estável que favorece a absorção pelas folhas.

GARANTIAS

Cobre	4,00% (50,4g/L)
Enxofre	1,80% (22,68g/L)
Magnésio	1,30% (16,38g/L)
Densidade	1,26g/L
Maior relação soluto/solvente	5mL/L
Natureza física	Fluído - Solução
Contém:	5,43% de Aditivo Umectante e Polissacarídeos
Registro do Produto	PR 001666-7.000015

SUGESTÃO DE DOSES

CULTURA	DOSE (mL/100L)	DOSE (L/ha)	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Cucurbitáceas	100 a 300	0,5 a 1,0	Aplicações quinzenais a partir do início do florescimento.
Folhosas	100 a 200	0,4 a 0,8	3 aplicações em intervalo semanal, iniciando 7 dias após o transplante.
Alho	100 a 200	0,3 a 0,5	Aplicações quinzenais, sendo a primeira aos 40 dias após plantio e as demais a partir dos 80/90 dias após plantio.
Batata	200 a 400	0,5 a 1,0	Aplicações quinzenais, iniciando na amontoa.
Brássicas	100 a 200	0,5 a 1,0	4 aplicações em intervalo quinzenal, iniciando 30 dias após transplante.
Café	100 a 200	0,3 a 0,5	Pós-colheita, Pré-florada e Pós-florada.
Cebola	200 a 400	0,5 a 1,0	Aplicações quinzenais, iniciando aos 40 dias após emergência.
Morango	100 a 200	1,0 a 2,0	Aplicações quinzenais na fase reprodutiva.
Tomate	100 a 300	1,0 a 3,0	Aplicações quinzenais, iniciando 20 dias após transplante.
Soja/Feijão	-	0,3	Aplicações no V3/V4 e V7/R1.
Milho	-	0,3 a 0,5	Aplicação com 4 e 8 folhas.
Trigo	-	0,3 a 0,5	3 aplicações em intervalo quinzenal, iniciando no perfilhamento (20 a 25 dias após emergência).
Cebolinha	200	-	3 aplicações em intervalo semanal.
Mudas	100	-	3 aplicações, iniciando 7 dias após emergência.

MODO DE APLICAÇÃO

Via foliar



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Produto para uso exclusivo agrícola. Impróprio para uso alimentar. O produto não pode ser transportado junto de pessoas, animais, rações, alimentos, bebidas, e medicamentos. Evitar contato com a pele e mucosas. Armazenar em local fresco, seco, ventilado, ao abrigo da luz, longe do alcance de crianças e animais domésticos. As recomendações de uso são indicativas e poderão ser alteradas de acordo com as necessidades de cada cultura. Composição Química: Acetato de Magnésio e Sulfato de Cobre. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Para maiores informações consulte nossos representantes.