



# CARBOCÁLCIO<sup>®</sup>

## Fertilizante Mineral Misto - Via Solo

**CARBOCÁLCIO** é um fertilizante mineral misto em suspensão concentrada, formulado com carbonato de cálcio em alta concentração para o suprimento deste nutriente em diversas culturas.

### MODO DE APLICAÇÃO:

**Via Solo.**

### GARANTIAS:

Ca - Teor Total - **25%** | Zn - Teor Total - **0,5%** | Zn - Solúvel em Ácido Cítrico 2% - **0,4%**

Densidade: **1,79 g/ml** | Contém: **1,07% de Aditivo Umectante e Estabilizante**

Natureza Física: **Fluído - Suspensão Concentrada** | Registro do Produto: **PR 001666-7.000081**

### RECOMENDAÇÃO DE USO

| CULTURA                       | DOSE (mL/100L) | DOSE (L/ha) | ÉPOCA DE APLICAÇÃO   |
|-------------------------------|----------------|-------------|--|
| Alface                        | 250 - 500      | 1,0 - 2,0   | Duas aplicações aos 14 e 21 dias após transplante.           |
| Banana                        | 400 - 600      | 2,0 - 3,0   | Aplicar em intervalo de 10-14 dias, quando necessário.       |
| Batata/Beterraba/Cenoura      | 350 - 700      | 1,5 - 3,0   | Iniciar 35 dias após emergência e repetir a cada 14 dias.    |
| Brássicas                     | 350 - 500      | 1,5 - 2,0   | Iniciar com 4-9 folhas e repetir a cada 14 dias.             |
| Café/Citros                   | 100 - 200      | 2,0 - 4,0   | Início das brotações, pré-florada, chumbinho e enchimento.   |
| Cebola/Alho                   | 250 - 500      | 1,0 - 2,0   | Aplicar 50 dias após emergência e repetir a cada 14 dias.    |
| Cucurbitáceas                 | 250 - 700      | 1,0 - 3,0   | Iniciar 21 dias após transplante e repetir a cada 14 dias.   |
| Maçã/Frutas (clima temperado) | 100 - 300      | 1,0 - 3,0   | Aplicações na fase vegetativa e reprodutiva.                 |
| Morango                       | 60 - 130       | 0,5 - 1,0   | Aplicar na pré-florada e repetir a cada 14 dias.             |
| Tomate/Pimentão               | 150 - 300      | 1,5 - 2,5   | Aplicações quinzenais a partir dos 55 dias após transplante. |
| Uva                           | 200 - 400      | 1,0 - 2,0   | Aplicações na fase vegetativa e reprodutiva.                 |

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Use o produto conforme as instruções deste rótulo ou de acordo com as recomendações de um Engenheiro Agrônomo. As instruções desse rótulo fazem parte de um programa básico de manutenção nutricional, podendo ser alteradas em função de alterações climáticas, análise de solo e/ou recomendações técnicas. **USO E ADVERTÊNCIAS:** Manter fora do alcance de crianças, animais e pessoal não autorizado. Evitar o contato com a pele, olhos e roupas. Usar EPI (Equipamento de Proteção Individual) durante o manuseio, evitando contato com a pele e os olhos. **MEIO AMBIENTE:** Preserve a natureza. Não danifique ou reutilize as embalagens. Destine-as conforme a legislação em vigor. **ARMAZENAMENTO:** Conservar o produto em sua embalagem original, fechado e identificado, em local coberto, arejado, ventilado, na sombra e sem contato com o solo e outros produtos. Para manter a qualidade, as embalagens utilizadas, ainda com o produto, devem ser mantidas fechadas. **GARANTIAS:** O fabricante garante o teor dos componentes indicados neste rótulo, não garantindo expressa ou implicitamente quanto ao uso desde produto, uma vez que a aplicação do mesmo está fora do seu controle.